


DetECCIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL:

¿Cuál es la prueba adecuada para usted?




#1 | Colonoscopia

- Un procedimiento que examina todo el colon y el recto y puede extirpar simultáneamente pólipos precancerosos. Un gastroenterólogo utiliza un tubo largo, delgado y flexible para realizar este procedimiento.
- Detecta más del 95 % de los cánceres colorrectales.
- Resultados Normales: Repetir el procedimiento cada 10 años.
- Pólipos Detectados: Repetir el procedimiento cada 3 a 5 años.



#2 | Cologuard®

- Análisis de heces casero con receta médica que detecta marcadores de DNA y sangre oculta relacionada con el cáncer colorrectal.
- Detecta aproximadamente el 92 % de los cánceres colorrectales.
- Resultados Normales: Repetir la prueba cada 3 años.
- Resultados Positivos: Se requiere una colonoscopia diagnóstica y la cobertura del seguro puede variar.



#3 | Fecal Immunochemical Test (FIT)

- Prueba de heces casera con receta médica que detecta sangre oculta en las heces.
- Detecta aproximadamente el 71 % de los cánceres.
- Resultados Normales: Repetir la prueba cada año.
- Resultados Positivos: Se requiere una colonoscopia diagnóstica y la cobertura del seguro puede variar.